

Số: /UBND-NN
Về việc chủ động ứng phó với rét
đậm, rét hại trên địa bàn xã

Tân Linh, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Các ông, bà thành viên BCD sản xuất nông nghiệp;
- Các ông, bà BCH PCTT&TKCN xã
- BCD Phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã;
- Các ông, bà Trưởng xóm trên địa bàn xã;

Thực hiện Công văn số 143/BCH-VPTT ngày 21/01/2024 của BCH PCTT&TKCN huyện Đại Từ về việc ứng phó với rét đậm, rét hại.

Để chủ động đối phó rét đậm, rét hại và sương muối, hạn chế tối đa thiệt hại đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và bảo vệ sức khỏe của người dân. UBND xã Tân Linh yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, đàn vật nuôi nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Thành viên được phân công phụ trách xóm chủ động liên hệ cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi.

2. Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thú y

Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và Tổ thú y xã thực hiện nhiệm vụ theo phân công, đối với thành viên phụ trách xóm thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống đói, rét dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi thủy sản. Phối hợp chặt chẽ với các xóm, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi thủy sản.

3. Các xóm trên địa bàn

- Tập trung tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với cây trồng.

- Vận động các trang trại, gia trại thực hiện nghiêm việc kê khai chăn nuôi, cam kết thực hiện các biện pháp an toàn trong chăn nuôi.

4. Các nhiệm vụ khác

- Tổ thú y, cán bộ thú y tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng bổ sung cho động vật các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm, báo ngay cho chính quyền địa phương khi phát hiện đàn vật nuôi có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

không buôn bán, vận chuyển, giết mổ hoặc vứt xác ra ngoài môi trường đối với gia súc bị ốm, chết.

- Tổ thú y tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc kê khai chăn nuôi đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo quy định tại phụ lục II thông tư số 23/2029/TT-BNNPTN Chủ động xây dựng và triển khai hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét trên đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng.

- Ban quản lý trạm truyền thanh xã, nêu cao hiệu quả hoạt động phát thanh từ xã đến các xóm về nội dung Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản.

(có hướng dẫn kèm theo)

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó với rét đậm, rét hại. UBND xã Tân Linh đề nghị các ông, bà thành viên BCD - BCH, các xóm, Tổ thú y và chủ các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi triển khai thực hiện nghiêm những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thành viên BCD SXNN xã;
- Thành viên BCD PCDB ĐV xã;
- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

HƯỚNG DẪN

Các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản

I. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT

1. Đối với trâu, bò

- Chuồng trại: Chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt, giữ khô nền chuồng. Dự trữ chất đốt như củi, trấu, mùn cưa... để đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại (chú ý đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ).

- Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng các loại hoá chất, vôi bột nhằm cắt đường lây nhiễm qua vật chủ trung gian, tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Để bảo vệ đàn trâu, bò phòng chống bệnh các hộ chăn nuôi cần chủ động phun thuốc diệt muỗi, ve, ruồi, côn trùng chân đốt xung quanh chuồng trại và khu vực chăn nuôi.

- Thức ăn: Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua...; tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng, vitamin để cung cấp đủ dinh dưỡng cho gia súc; tăng cường chế biến thức ăn ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét.

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng: trâu, bò già, yếu và gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để phòng chống đói, rét và dịch bệnh.

+ Cho trâu, bò ăn đầy đủ với lượng tham khảo: một con trâu, bò khối lượng 300kg cho ăn khoảng 30-40kg cỏ các loại (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ure,...) và 3,5kg thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) trong một ngày đêm.

+ Bổ sung muối ăn với lượng 15g hoà vào nước ấm cho trâu, bò uống.

+ Chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt khô, ráo, kín gió, có sưởi ấm vào ban đêm; tận dụng bao tải gai, bao tải dứa làm áo chống rét để giữ ấm cho trâu, bò. Không thả rông trong rừng núi, không chăn thả ngoài trời, bãi chăn thả tập trung, không cho trâu, bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12⁰C.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho trâu, bò theo quy định.

2. Đối với lợn

- Hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ.

- Không phun nước cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12⁰C.

- Cho uống đủ nước sạch, ấm; bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

- Định kỳ vệ sinh làm sạch và phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Virkon, Han-Iodine, Benkocid... hoặc vôi bột.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như: Dịch tả lợn, Tụ đầu lợn, Lở mồm long móng...

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn.

3. Đối với gia cầm

- Chuồng trại: Chuẩn bị đầy đủ phên, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m²; gà thịt: 8-10 con/ m².

- Đảm bảo cho gà ăn thức ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng lứa tuổi; uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hoá, điện giải... để nâng cao sức đề kháng của gia cầm.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng, làm đệm lót sinh học để chăn nuôi.

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất được phép sử dụng.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm theo quy định.

4. Đối với thủy sản

- Chuẩn bị vào mùa đông: Cho cá ăn đủ chất và lượng, bổ sung vitamin C vào thức ăn, với lượng 50-60mg/kg thức ăn cho cá da trơn, 30mg/kg thức ăn cho cá có vây. Cá đưa vào nuôi qua đông đảm bảo khoẻ mạnh, không xây xát, không bị bệnh; xử lý đáy ao đảm bảo bùn đáy không bị ô nhiễm, dày 15-20cm. Những cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm.

- Chăm sóc cá trong mùa đông:

Những ngày thời tiết ấm, cho cá ăn đủ thức ăn có chất lượng tốt hoặc thức ăn công nghiệp. Bổ sung vitamin C vào khẩu phần ăn với liều lượng như trước mùa đông. Định kỳ 2 tuần 1 lần bón vôi khử trùng cho ao với lượng 1-2kg vôi bột/100 m³ nước ao, hoặc bằng TCCA (Trichloroisocyanuric acid) với liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì để ổn định môi trường nuôi hạn chế bệnh cho cá. Trong thời gian giá rét tuyệt đối không kéo lưới, không thu hoạch theo cách đánh tĩa, thả bù để tránh xây xát cho cá. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của cá để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Áp dụng các biện pháp chống rét sau:

Duy trì độ sâu mực nước ao trên 1,5m (đối với ao nuôi cá Chim trắng, rô phi và một số loại cá chịu lạnh kém cần duy trì mực nước sâu >2m). Mặt ao thả bè tây, chiếm khoảng 1/3 - 2/3 diện tích ao về phía Bắc. Đào hồ trong ao sâu 2,5-3m, rộng 2-3m² cho cá rút xuống trú đông. Dùng rơm rạ đã được phun nước vôi và phơi khô cho vào các sọt, cắm cọc chìm các sọt xuống đáy ao cho cá chui vào trú.

Bơm nước ấm vào ao: Cần tận dụng triệt để các nguồn nước ấm để cấp cho ao. Những ngày trời rét đậm (dưới 12⁰C) bơm nước giếng khoan hoặc nguồn nước ấm đảm bảo an toàn khác đưa vào đáy ao ở khu vực khuất gió để nâng nhiệt độ khu vực đó lên và có thể cho cá ăn tại khu vực này.

Làm mái che bằng nilon trắng trong, bung kín trên khung tre hay kim loại thiết kế theo hình mái nhà trên bề mặt ao, để khoảng thoáng từ mặt ao đến đỉnh mái che > 2m.

Đối với cơ sở nuôi thủy sản bố mẹ, lưu giống thủy sản qua đông, ngoài việc thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rét, cần thực hiện tốt quy trình kỹ thuật nuôi vỗ, quy trình ương nuôi cá giống; tu sửa, bảo dưỡng hệ thống ao nuôi, hệ thống sinh sản và các điều kiện cần thiết để phục vụ sản xuất.